


5歳から11歳のお子さまへの  
新型コロナウイルスの接種がはじまりました。

# 新型コロナウイルス接種について 正しい知識で考えましょう




**守ってほしい、たいせつなこと**

- ★ ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。
- ★ ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にしてはいけません。

## ワクチン接種までの流れ

- ・ お手元に接種券が届きましたら、接種場所や予約の方法などを確認してください。
- ・ 接種券が届かない場合、住民票がある市町村にお問い合わせください。



- ・ ワクチン接種を受けることができる、医療機関/接種会場を探します。
- ・ 市町村の予約方法（インターネット/コールセンターなど）に沿って、接種の予約をしてください。
- ・ 副反応にそなえて、無理のない日程で予約しましょう。

## 予約

## 接種当日

- ・ 5～11歳のお子さまの接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要でです。
- ・ 当日は以下の持ち物を忘れずに接種会場に持参してください。


- 接種券（クーポン券）
- 予診票
- 本人確認書類（健康保険証など）
- 母子健康手帳

接種しやすいように、肩の出しやすい服装をお願いします。

接種後、接種会場にて状態観察のため、15～30分程度お待ちいただきます。時間に余裕をもってお越しください。

通常の生活は問題ありませんが、激しい運動などは避けてください。

数日後も症状がよくなっていない場合や、症状がひどい場合は、医療機関にご相談ください。



**厚労 コロナ ワクチン 子ども 接種**  
ホームページをご覧にならない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。


子どもに対する新型コロナウイルスの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス接種に関して、健康面などで相談したい場合は、こちらまでお問い合わせください。

熊本県ワクチンに関する専門的相談窓口  
TEL 096-285-5622  
〈受付時間〉24時間対応（土日祝日含む）

熊本県・公益社団法人熊本県医師会（監修）

2022年3月作成




# 5歳から11歳のお子さまのお子さまへ

しんがた

# 新型コロナウイルスワクチン接種について

## 保護者の方へ



### ワクチンをなぜ受けるの？

☆ ワクチンを受けると、体の中で、新型コロナウイルスとたたかう用意ができていきます。ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなくなりになります。

☆ 多くの人がワクチンを受けることで、社会で感染が広がりにくくなります。

☆ 感染が広がりにくくなれば、ワクチンを受けられない人や病気などで免疫が十分でない人を感染から守ることができきます。





### ワクチンを受けたあとは？

☆ ワクチンを受けると、以下の症状が出るがありますが、2～3日で自然とよくなるのがわかっています。

- ・ねっ ・気持ちわるさ ・だるさ ・おなかをこわす
- ・頭のいたみ ・さむけ

☆ 当日はお風呂に入るなど、いつもどおりの生活をするのは問題ありませんが、はげしい運動はやめましょう。

☆ ワクチンを受けたあとも、手洗い・消毒・マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



### ワクチンの必要性は？

■ 小児においても中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患(※)を有するなど、重症化するリスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされています。

■ 国では、新たな変異株が流行することも懸定されるため、小児を対象に、ワクチン接種を進めることとされました。

(※) 日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」



### ワクチンの副反応は？

■ ワクチンを受けた後は、注射した部分の痛みが一番多く現れます。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中程度であり、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

■ 数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労
10～50%	頭痛、注射した部位の発赤や腫れ、筋肉痛、悪寒
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

■ ごくまれですが、海外では子どもでも心筋炎を発症した例が報告されています。アメリカでは、新型コロナウイルス接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

### ワクチンの種類は？

■ ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

